【Ⅳ】　救命処置の年齢別比較

<table>
<tr><th colspan="2">年齢
救命処置</th><th>成人（８歳以上）</th><th>小児（1~８歳未満）</th><th>乳児（12ヶ月未満）</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">通　報</td><td>反応がなければ
大声で助けを呼ぶ</td><td colspan="2">救助者が一人だけの場合、
先に２分間の心肺蘇生を法を実施</td></tr>
<tr><td colspan="2">１１９番通報とＡＥＤの手配</td><td>１１９番通報</td></tr>
<tr><td colspan="2">気道の確保</td><td colspan="3">頭部後屈あご先挙上法</td></tr>
<tr><td colspan="2">心肺蘇生法の開始</td><td colspan="3">正常な呼吸（普段どおりの息）をしていない</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">人工呼吸
（省略可能）</td><td colspan="3">約１秒かけて２回吹き込む・胸の上がりが見えるまで</td></tr>
<tr><td colspan="2">口対口</td><td>口対口鼻</td></tr>
<tr><td rowspan="5">胸骨圧迫</td><td>圧迫の位置</td><td colspan="2">胸の真ん中
（両乳頭を結ぶ線の真ん中）</td><td>左右の乳頭を結ぶ線
の少し足側</td></tr>
<tr><td>圧迫の方法</td><td>両手で
（指を組む）</td><td>両手（指を組む）
または、片手で</td><td>２本指で
（中指と薬指）</td></tr>
<tr><td>圧迫の深さ</td><td>４～５ｃｍ程度</td><td colspan="2">胸の厚みの１／３</td></tr>
<tr><td>圧迫のテンポ</td><td colspan="3">１分間に約１００回</td></tr>
<tr><td>胸骨圧迫と
人工呼吸の比</td><td colspan="3">３０：２</td></tr>
<tr><td rowspan="3">ＡＥＤ</td><td>装着のタイミング</td><td colspan="2">到着次第</td><td rowspan="3">ＡＥＤは使用しない</td></tr>
<tr><td>電極パッド</td><td>成人用パッド</td><td>小児用パッド（やむをえない場合は成人用パッド）</td></tr>
<tr><td>電気ショック後の対応</td><td colspan="2">ただちに心肺蘇生法を再開（５サイクル２分間）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">気道異物</td><td>反応あり</td><td colspan="2">腹部突き上げ法
背部叩打法</td><td>背部叩打法
（片腕の上でうつぶせ）</td></tr>
<tr><td>反応なし</td><td colspan="3">通常の心肺蘇生法の手順</td></tr>
</table>

メモ